

nam cauiam huc decumbat, eodemque colligatur. Deinceps haec interior propago notatu digna
^h diffundit ramum, qui in uiris dextrum uescicae latus amplectitur, & in plures scissus furculos, ue-
 scicae ceruicem seu penem adit, in eumque numerose digeritur, ea semper serie ut ceruici crassiores
 amplioresque furculi, quam uescicae fundo exporrigantur. In mulieribus uero ^h praesens ramus
 ab interna diductus propagine pingui membrana suffulcitur, ac quibusdam furculis uescicam
 quidem adit, uerum frequentioribus inferiorem fundi uteri sedem intercurrit, ramulos quoque
 spectabiles in uteri ceruicem dispergens, per quos uirginibus & nonnullis mulieribus, quae pri-
 mis mensibus utero gerunt, menstruae purgationes colari dissectionum professoribus uisum est:
 quanquam & in reliquis mulieribus ab harum propaginum oris non minimum eius sanguinis
 profuere adhuc existimem. Arabum nonnulli quinque numero uenulas in medium longitudi-
 nis uteri ceruicis diffundi astruunt, & dextrarum uenarum ora cum sinistrarum oris connue-
 re committique, ac ab illis puellarum hymen constitui docent, uenarum huc pertinentium copia
 (ut in Arabum interpretu libris legitur) centonem nuncupantes. Quod uero ^h interioris rami
 sinistri trunci eius supra os sacrum factae diuisionis adhuc reliquum est, ad pubis os contendit, &
^h ab externo ramo trunci uenae cauae sobolem assumit, quae cum eo interioris rami reliquo con-
 gressa, unam cum ipso ^h uenam efformat, quae primum peritonaeum, ac dein ^h decimum femur
 mouentium perforat musculus, & ossis pubis ^h foramen permeans in crus emergitur, proprium
 sinum in elatiori eius foraminis sede sibi uenicans, quo simul cum sua coniuge ^h arteria acitem
^h neruo fertur, ac foraminis eius ^h membranam, & ^h nonnumquam femoris motus autorem musculus
 transiens, illis quos perreptat musculis ramos porrigit. Quando autem in crus pertendit, in mu-
 sculos a pubis osse principium ducentes digeritur, in elatiorem uidelicet ^h secundi tibiae mo-
 uentis musculi sedem, qui a pubis ossium commissura enascitur. Humilior enim eius musculi
 pars a maiori crus petenti uena ^h ramos sibi asciscit. Dein ab hac pubis ossis foramen transeun-
 te uena, rami in ^h quinti femur mouentis musculi partem a pubis osse pronatam, ac postmodum
 in ^h octauum femur mouentem musculus & penis etiam ^h musculos digeruntur, a quibus fur-
 culi nimis quam exiles in femoris internae sedis cutem in inguinum regione prodeunt. Praeter
 ramos autem illis musculis & cuti exporrectos, ^h unus etiam articulum coxendicis accedit, pro-
 prio ^h sinu coxendicis ossis acetabulum priuatim subiens. Et utcumque multifariam haec crus
 petens uena digeritur, rarius medium longitudinis femoris superat, sed interdum praecipuus
 ipsius ramus quinto femur mouenti musculo dispensatus, propagini ^h commiscetur, quae huc
 pertinet a maiori uena in crus deducta. Exterior uenae cauae trunci ramus, quem oblique crus
 accedit, priusquam peritonaeum perforat, ab elatiori ipsius sede ^h uenam mediocri magnitudi-
 ne expromit, quae sursum ad abdominis anteriora per peritonaeum ducta, ipsi ramulos quos-
 dam utrobique communicat. Vbi haec ad istum modum peritonaeo connexa ad rectum abdo-
 minis musculus ^h confendit, peritonaeum perforans in internam posteriorem uel recti abdo-
 minis musculi sedem inferitur, & utrinque uarias soboles in transversum abdominis muscu-
 lum, & ipsi incumbentes oblique reliquasque proximas sedes distribuit, recto tramite sursum
 sub recto musculo protensus. ^h Vbi uero ad abdominis medium paulo supra umbilici re-
 gionem prorepit, ipsius extremum in plures furculos disseminatur, qui ramulos spectant,
 quos a uena sub pectoris osse ^h ab elatiori thoracis sede delata, diffundi commemorauimus.
 Huius uenae interuentu mamillis cum utero communionem esse credimus, eius quippe be-
 neficio ex mamillarum uenis in uterum quum fetus enutritur, sanguinis retractionem: quum
 autem mulier lactat, ex uteri uenis in mamillarum uenas menstrui sanguinis reuulsionem perfici,
 medicis pariter concessum est omnibus. Venam enim deorsum ex alto procurrētem, ramos
 mamillarum corpori diffundere, nemo non scribit: etiam si id non adeo obiter concessum esse ue-
 limus. Vena uero ab imo sursum confendens, non ita procul ab uteri uenis originem ducit.
 Deinde ^h alteram uenam in ortu quasi coniugem sortitur, ad pudendum excurrentem. Exterior
 enim uenae cauae sinistri trunci ramus, quando supra coxendicis os in femur prociens, pe-
 ritonaeum transiit, ab interiori ipsius regione aliam promit uenam, quae ad pubis ossium ^h mediū
 quā inuicem cartilaginis interuentu haec uniuntur accedens, uiris in penis ^h inuolucrum & scro-
 tum, mulieribus autem in pudendi colliculos, & in ^h coriaceas carunculas (quas *uulgu* uocat)
 uicinasque sedes numerosa ramorum serie digeritur. Porro uena sub recto abdominis musculo
 sursum exporrecta nullam parem adipiscitur, quae in uterum (uti medicorum uulgu arbitra-
 tur) descendat: sed ut prius monebam, illa ab his quae in uterum digeruntur non ita multum di-
 stat. Quandoquidem ipsius principium ab exteriori ramo sinistri trunci uenae cauae pendet, il-
 lis ab interioris eius trunci rami interna propagine originem ducentibus, atque in uteri ceruicem
 ipsiusque fundi humiliorem sedem diffusis.

VENAE



RAETER cauae ^h propaginem
 sedem in femur aliquouque pro-
 una quidem angustior, quam p-
 riorum femoris sedem amplexat
 medium ^h cessare, superiori Cap-
 rarumque uenarum in crus sinistru-
 rentium caudex ab ^h externo ran-
 crum paritionis pendet. Praesens uena simulatque e-
 ossis sedem ad internū latus ^h sedis, qua sextus & septi-
 dunt, in inguina labitur, ac anteriorem (uersus interiorē)
 & nullo occultata musculo ^h sinui insidet, qui in ingu-
 tibiam mouentium primo, una cum ^h octauo femoris
 seu cauitati incumbens, in plures ramos discinditur, atque
 xia, primis suis distributionibus Natura ^h frequente-
 posuit, quae firmam stabilemque uenae propagationem
 uena simul, & ^h arteria ^h neruoque hac descenditibus o-
 ualis efficerentur. ^h Prima huius uenae crus petentis p-
 latere principium ducens, ad anteriorem femoris cu-
 sedem deorsum per genu quoque interiora, & hinc i-
 sus ^h malleolum interiore sub cute exporrigitur. &
 uariē inibi digeritur, alijs huc pertinentibus uenarum
 ita quidem sub cruris cute carnea suffultam membran-
 quā interiori exporrigitur malleolo, uniuerſim non en-
 interdum ab interna tibiae sede secundum anteriorem
 excurrit, aliquando uero (sed rarius) sub malleolo cor-
 dens. Deinde in ramorum ad pedis digitos & suprap-
 do enim alijs quibusdam ramis hinc commixta, ad mi-
 puē deducitur, aliquando uersus pollicem & indicem
 parem unquam reperias huius propaginis ramorum
 quos in descensu profert, rarissime inuicem aut num-
 quidem inordinate ad cutem permeant. ut plurimum
 regionis cutem, non procul a suo ortu, utrobique un-
 femoris interiora & inguina, ipsūque quasi perinaeum
 est inter anum & testes, aut muliebri pudendum con-
 crassior est, femoris anteriora & exteriora sub cute pe-
 digeritur. Quum grandis haec propago ad medium
 tati dignos ramos hinc etiam in cutem dispergit, &
 musculo porrigit, quem tibiani mouentium primum
 nu articulum uelut ad posteriora orbiculatim ea pro-
 que emittit soboles mutuo quidem mole pares, sed ex-
 tem secundum patellā dispergitur: altera interioris ger-
 dit. Haec posterior soboles aliquando penitus deesse
 tunc scilicet cum ^h propria genu flexus cutē accedens u-
 sedis tibiae cutem a ^h magna hac propagine, & antior
 qui impari numero sparsi, rursus cum proximis uenis i-
 tur. Super elatiorem uero pedis regionem, uena haec q-
 smode spargitur. Atque haec propaginis per interna
 Praeter hanc maxima in crus subiens uena e regione nu-
 quae extrorsum ducta in anteriore articuli coxendicis cu-
 buitur. Postquam uero maxima uena has edidit propa-
 amplexantes immergitur, & ^h insignem ramum ^h septimū
 communicat, a quo etiā tenues furculi in cutem deriuat-
 dum distribuit uenam, nuper commemorata ampliorē
 musculum digeritur, ramosque in ^h octauum tibiae mot-